

Xulane[®]
(sistema transdérmico de
norelgestromina y etinilestradiol)
150/35 µg al día

Infórmate sobre un **parche** **anticonceptivo** **semanal.**

XULANE se aplica una vez a la semana durante 3 semanas. El parche no se aplica en la semana 4.

Comprueba el parche todos los días para asegurarte de que todos los extremos estén bien adheridos.

Para mujeres con un índice de masa corporal (IMC) inferior a 30 kg/m².

Consulta las *Limitaciones de uso* a continuación.



Escanea el código
para obtener más
información
sobre **XULANE**.



Paciente no real. El parche es una interpretación artística que se muestra a escala.

¿Qué es XULANE?

XULANE es un parche anticonceptivo para mujeres con un IMC inferior a 30 kg/m². Contiene dos hormonas femeninas, un estrógeno denominado etinilestradiol y un progestágeno denominado norelgestromina.

Las hormonas de XULANE penetran en el torrente sanguíneo y el organismo las procesa de un modo diferente a las hormonas de las píldoras anticonceptivas. **Si usas XULANE, estarás expuesta a alrededor de un 60 % más de estrógeno que si usas una píldora anticonceptiva común con 35 microgramos de estrógeno.** En general, un mayor porcentaje de estrógeno puede aumentar el riesgo de sufrir efectos secundarios.

Limitaciones de uso: Es posible que XULANE sea menos eficaz en mujeres con un peso superior a los 90 kg (198 lbs). Si pesas más de 90 kg (198 lbs), habla con tu profesional sanitario para determinar cuál es el método anticonceptivo más adecuado para ti.

No uses XULANE si tu índice de masa corporal (IMC) es de 30 kg/m² o más.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

ADVERTENCIA

¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre XULANE?

No uses XULANE si eres fumadora y tienes más de 35 años. El tabaco aumenta el riesgo de padecer efectos secundarios cardiovasculares graves con el uso de métodos anticonceptivos hormonales, incluida la muerte por ataque al corazón, coágulos sanguíneos o derrame cerebral. Este riesgo aumenta con la edad y con el número de cigarrillos que fumes.

No uses XULANE si tienes un riesgo alto de formación de coágulos.

No uses XULANE si tu índice de masa corporal (IMC) es de 30 kg/m² o más. Las mujeres con un IMC de 30 kg/m² o más que usen XULANE pueden tener un mayor riesgo de formar coágulos sanguíneos en comparación con las mujeres con un IMC inferior a 30 kg/m².

XULANE no protege contra la infección por VIH (SIDA) ni contra otras infecciones de transmisión sexual.

Consulta la Información de seguridad importante completa en las páginas 20 y 21 y el [Breve resumen de información para el consumidor que se adjunta](#), incluida la **ADVERTENCIA**.

Conoce el parche XULANE

Xulane®
(sistema transdérmico de
norelgestromina y etinilestradiol)
150/35 µg al día

¿Buscas una opción anticonceptiva diferente?

Conoce XULANE (zoo-lane): un parche anticonceptivo para mujeres con un IMC inferior a 30 kg/m².

XULANE es un parche anticonceptivo semanal que se aplica en la parte superior externa del brazo, el abdomen, la nalga o la espalda, en un lugar donde no se frote contra la ropa ajustada. El parche XULANE se aplica en un ciclo de 4 semanas. Te debes aplicar un parche una vez por semana durante 3 semanas. La semana 4, cuando esperas el período menstrual, es la semana sin parche.

El parche XULANE debe estar bien pegado a tu piel para que funcione adecuadamente; por eso recuerda comprobar el parche todos los días para asegurarte de que todos los extremos estén bien adheridos.

En estudios clínicos de un producto similar que contiene NGMN/EE, aproximadamente el 2 % de los parches se despegan completamente y el 3 % se despegan parcialmente. Habla con tu profesional sanitario si tienes alguna pregunta sobre el uso del parche XULANE.

Las probabilidades de que te quedes embarazada dependen de lo bien que sigas las instrucciones de uso de XULANE. En estudios clínicos de un producto similar que contiene NGMN/EE, entre 1 y 2 de cada 100 mujeres se quedaron embarazadas durante el primer año que usaron el parche de NGMN/EE según las instrucciones. XULANE puede no ser tan eficaz a la hora de evitar un embarazo en mujeres con un peso de 90 kg (198 lbs) o más. Si pesas más de 90 kg (198 lbs), habla con tu profesional sanitario para determinar cuál es el método anticonceptivo más adecuado para ti. **No uses XULANE si tu IMC es de 30 kg/m² o más.**

Esta no es una lista completa de los motivos por los que XULANE podría no ser adecuado para ti. Para más información, consulta la explicación “¿Quién no debería usar XULANE?” que aparece a continuación en el recuadro rosa.

Los métodos anticonceptivos hormonales, como XULANE, reducen las probabilidades de embarazo. No protegen contra la infección por VIH (SIDA) ni contra otras enfermedades de transmisión sexual.¹

NGMN: norelgestromina EE: etinilestradiol

99 % de efectividad*

Cuando se utiliza según las indicaciones.

En estudios clínicos de un producto similar que contiene NGMN/EE, entre 1 y 2 de cada 100 mujeres se quedaron embarazadas durante el primer año de uso, cuando se utilizó según las instrucciones.

*** Consulta las Limitaciones de uso**



Paciente no real. El parche es una interpretación artística que se muestra a escala.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (Continuación)

Limitaciones de uso: Es posible que XULANE sea menos eficaz en mujeres con un peso superior a los 90 kg (198 lbs). Si pesas más de 90 kg (198 lbs), habla con tu profesional sanitario para determinar cuál es el método anticonceptivo más adecuado para ti.

No uses XULANE si tu índice de masa corporal (IMC) es de 30 kg/m² o más.

¿Quién no debería usar XULANE?

No uses XULANE si tienes o has tenido coágulos sanguíneos; un problema hereditario que hace que tu sangre se coagule más de lo normal; antecedentes de

ataque cardíaco, accidente cerebrovascular o ciertos problemas de valvulopatías o del ritmo cardíaco que puedan provocar que se formen coágulos de sangre en el corazón; presión arterial alta que no se puede controlar con medicamentos; diabetes con daño renal, ocular, nervioso o en vasos sanguíneos; determinados tipos de cefaleas migrañosas graves con aura, entumecimiento, debilidad o alteraciones de la visión, o algún tipo de cefalea migrañosa si tienes más de 35 años; un IMC de 30 kg/m² o más; enfermedad hepática o tumores en el hígado; sangrados vaginales sin explicación; has tenido cáncer de mama o algún tipo de cáncer sensible a las hormonas femeninas; si tomas medicamentos para la hepatitis C que contengan ombitasvir/paritaprevir/ritonavir, con o sin dasabuvir, ya que esto puede aumentar los niveles de la enzima hepática “alanina aminotransferasa” (ALT) en la sangre; o si estás o pudieras estar embarazada.

Consulta la Información de seguridad importante completa en las páginas 20 y 21 y el [Breve resumen de información para el consumidor que se adjunta](#), incluida la **ADVERTENCIA**.

Tamaño de XULANE

El parche XULANE puede ser más pequeño de lo que piensas

Con solo 3,81 cm x 3,81 cm (1,5" x 1,5"), es un poco más grande que una moneda de 25 centavos de dólar. Y, para ponértelo, puedes elegir entre 4 opciones, por lo que incluso puedes llevarlo debajo de la ropa.¹ Consulta las páginas 6-7 para ver dónde puedes colocarte XULANE.



Para más información } [Xulane.com](https://www.Xulane.com)

Xulane®
(sistema transdérmico de
norelgestromina y etinilestradiol)
150/35 µg al día



Paciente no real. El parche es una interpretación artística que se muestra a escala.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (Continuación)

Antes de usar XULANE:

Comenta con tu profesional sanitario todas las enfermedades que padeces, incluyendo:

- Si estás embarazada o crees que puedes estarlo.
- Si tienes programada una intervención, ya que XULANE puede aumentar el riesgo de que se formen coágulos de sangre tras la intervención.
- Si tienes programado hacerte algún análisis, ya que XULANE puede afectar a ciertos análisis de sangre.

Consulta la Información de seguridad importante completa en las páginas 20 y 21 y el [Breve resumen de información para el consumidor que se adjunta](#), incluida la **ADVERTENCIA**.

- Si tu piel o tus ojos han presentado una coloración amarilla causada por el embarazo o relacionada con el uso previo de anticonceptivos hormonales.
- Estás en período de lactancia o planeas amamantar. XULANE puede reducir la cantidad de leche que produzcas, y es posible que una pequeña cantidad de las hormonas del parche XULANE se transfieran a la leche materna.

Comenta con tu profesional sanitario todos los medicamentos y productos de fitoterapia que estás tomando, incluidos aquellos para las convulsiones y el tratamiento reemplazante de la hormona tiroidea, ya que algunos de estos pueden requerir un ajuste de dosis o hacer que XULANE sea menos eficaz.

Algunos medicamentos y el zumo de pomelo pueden aumentar tus niveles de hormona etinilestradiol si se combinan con XULANE.

¿Dónde se coloca el parche XULANE?

XULANE puede ponerse en la parte externa del brazo, en el abdomen, en la nalga o en la espalda, en un lugar donde no lo roce la ropa ajustada. Comprueba el parche todos los días para asegurarte de que todos los extremos estén bien adheridos.

Colócalo únicamente sobre la piel limpia y seca. **El parche debe estar bien pegado a tu piel para que funcione adecuadamente.** No te lo pongas en el pecho, sobre la piel cortada o irritada ni en la misma zona cutánea que el parche anterior. **No** uses lociones, cremas, aceites, polvos o maquillaje en la zona del parche. **No** intentes volver a colocar un parche si ya no se pega. **No** pegues el parche con celo ni te lo envuelvas en la piel.¹




Para obtener instrucciones detalladas, consulta las instrucciones paso a paso [2] de uso de XULANE en la sección de Información para el paciente del Breve resumen de información para el consumidor que se adjunta, incluida la **ADVERTENCIA.**

Visit [Xulane.com](https://www.xulane.com)

* El parche es una interpretación artística que se muestra a escala

Xulane®
(sistema transdérmico de norelgestromina y etinilestradiol)
150/35 µg al día



Paciente no real.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (Continuación)

¿Cuáles son los efectos secundarios más frecuentes de XULANE?

Los efectos secundarios más frecuentes comunicados en al menos un 5 % de las mujeres durante los ensayos clínicos fueron síntomas mamarios (molestias, hinchazón o dolor); náuseas/vómitos; cefalea; irritación, enrojecimiento, dolor o hinchazón de la piel, picor o erupción en el lugar de aplicación del parche; dolor de estómago; dolor durante la menstruación; sangrado vaginal y trastornos menstruales, como manchado o sangrado entre períodos; y trastornos anímicos, afectivos y de ansiedad.

Comenta con tu profesional sanitario cualquier efecto secundario que te preocupe o que no desaparezca. Estos no son todos los posibles efectos secundarios de XULANE. Si deseas obtener más información, consulta a tu profesional sanitario o farmacéutico. **Llama a tu**

Consulta la Información de seguridad importante completa en las páginas 20 y 21 y el [Breve resumen de información para el consumidor que se adjunta](#), incluida la **ADVERTENCIA.**

profesional sanitario para recibir asesoramiento médico sobre los efectos secundarios. **Te animamos a que informes a la FDA sobre los efectos secundarios negativos de medicamentos de venta con receta. Visita www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.**

¿Los anticonceptivos hormonales provocan cáncer?

No se sabe si los anticonceptivos hormonales provocan cáncer. Algunos estudios, pero no todos, parecen indicar que podría haber un ligero aumento del riesgo de cáncer de mama entre las usuarias actuales que los hayan utilizado durante más tiempo.

Las mujeres que utilicen métodos anticonceptivos hormonales pueden tener una probabilidad ligeramente más alta de padecer cáncer de cuello uterino. Sin embargo, este puede deberse a otros motivos como tener más parejas sexuales.

Esta no es toda la información que debes leer antes de usar XULANE. Consulta el Breve resumen de información para el consumidor que se adjunta, incluida la **ADVERTENCIA.**

¿Cuáles son los riesgos más graves de tomar XULANE?

XULANE puede causar efectos secundarios graves, incluida la formación de coágulos sanguíneos, especialmente si se tienen otros factores de riesgo como fumar, la obesidad o una edad superior a los 35 años. Algunos ejemplos de formación de coágulos sanguíneos son la trombosis venosa profunda (piernas), las embolias pulmonares (pulmones), la pérdida de visión (ojos), los ataques cardíacos (corazón) y los accidentes cerebrovasculares (cerebro). **Todos ellos pueden causar la muerte o discapacidad permanente.**

El riesgo de formación de coágulos sanguíneos es más alto cuando se usa XULANE por primera vez y al volver a usar XULANE u otro anticonceptivo hormonal distinto, después de una pausa de un mes o más.

Algunos estudios indican que las mujeres que usan un sistema transdérmico con norelgestromina y etinilestradiol tienen un mayor riesgo de formar un coágulo. Habla con tu profesional sanitario sobre tu riesgo de formar un coágulo antes de usar XULANE o de decidir qué tipo de método anticonceptivo es adecuado para ti.

Estos no son todos los riesgos de usar XULANE. Consulta las páginas 20-21 de este folleto, donde encontrarás información adicional sobre la seguridad de XULANE, y habla con tu profesional sanitario sobre los beneficios y riesgos de usar XULANE.¹

NGMN: norelgestromina EE: etinilestradiol

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (Continuación)

¿Cuáles son los riesgos más graves de tomar XULANE?


XULANE puede causar efectos secundarios graves, incluida la formación de coágulos sanguíneos, especialmente si se tienen otros factores de riesgo como fumar, la obesidad o una edad superior a los 35 años. Algunos ejemplos de formación de coágulos sanguíneos son la trombosis venosa profunda (piernas), las embolias pulmonares (pulmones), la pérdida de visión (ojos), los ataques cardíacos (corazón) y los accidentes cerebrovasculares (cerebro).

Todos ellos pueden causar la muerte o discapacidad permanente.

El riesgo de que se formen coágulos de sangre es mayor cuando se empieza a utilizar XULANE y cuando se vuelve a utilizar XULANE o un anticonceptivo hormonal diferente después de una pausa de un mes o sistema transdérmico con norelgestromina y

Consulta la Información de seguridad importante completa en las páginas 20 y 21 y el [Breve resumen de información para el consumidor que se adjunta](#), incluida la **ADVERTENCIA**.

Xulane[®]
(sistema transdérmico de
norelgestromina y etinilestradiol)
150/35 µg al día



Retrato de actor

etinilestradiol tienen un mayor riesgo de formar un coágulo. Habla con tu profesional sanitario sobre tu riesgo de formar un coágulo antes de usar XULANE o de decidir qué tipo de método anticonceptivo es adecuado para ti.

Llama a tu profesional sanitario inmediatamente si tienes:

Dolor en las piernas que no desaparece; dificultad para respirar repentina; ceguera repentina, parcial o completa; dolor intenso o presión en el pecho; cefalea repentina y grave, distinta de las cefaleas habituales; debilidad o entumecimiento en un brazo o pierna, o dificultad para hablar; coloración amarilla de la piel o los ojos.

Otros riesgos graves incluyen:

Problemas hepáticos incluidos tumores en el hígado, problemas en la vesícula biliar; presión arterial alta.

¿Los parches son lo mío?*

Xulane®
(sistema transdérmico de
norelgestromina y etinilestradiol)
150/35 µg al día

XULANE no es para todo el mundo. Habla con tu médico sobre tus antecedentes médicos, riesgos para la salud y tus elecciones de estilo de vida para determinar si el parche XULANE es adecuado para ti.¹

¿Qué quieres saber de tu anticonceptivo?

QUIERO

 Ayudar a prevenir el embarazo en esta etapa de mi vida

 Explorar mis opciones anticonceptivas

 Mantener abiertas mis opciones de planificación familiar

* Los factores anteriores no son los únicos a tener en cuenta a la hora de determinar si el parche XULANE se adapta a tus necesidades anticonceptivas particulares. Asegúrate de evaluar los riesgos y beneficios de todas tus opciones con tu profesional sanitario.

No utilice XULANE si fuma y tiene más de 35 años, o si:

- si tienes o has tenido coágulos
- tiene un problema hereditario que hace que su sangre se coagule más de lo normal
- tiene un historial de ataques al corazón, derrames cerebrales o ciertos problemas de las válvulas del corazón o del ritmo cardíaco que pueden causar la formación de coágulos de sangre en el corazón
- tiene una presión arterial alta que los medicamentos no pueden controlar
- tiene diabetes con daños en los riñones, los ojos, los nervios o los vasos sanguíneos
- ha tenido ciertos tipos de migrañas severas con aura, entumecimiento, debilidad o cambios en la visión o cualquier migraña si tiene más de 35 años
- tiene un IMC de 30 kg/m² o más
- tiene una enfermedad del hígado o tumores hepáticos
- tiene una hemorragia vaginal inexplicable;
- está embarazada o cree que pueda estarlo.
- hormonaa tenido cáncer de mama o algún tipo de cáncer sensible a las hormonas femeninas.
- si toma medicamentos para la hepatitis C que contengan ombitasvir/paritaprevir/ritonavir, con o sin dasabuvir, ya que esto puede aumentar los niveles de la enzima hepática "alanina aminotransferasa" (ALT) en la sangre

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (Continuación)

Limitaciones de uso: Es posible que XULANE sea menos eficaz en mujeres con un peso superior a los 90 kg (198 lbs). Si pesas más de 90 kg (198 lbs), habla con tu profesional sanitario para determinar cuál es el método anticonceptivo más adecuado para ti.

No uses XULANE si tu índice de masa corporal (IMC) es de 30 kg/m² o más.

¿Quién no debería usar XULANE?

No uses XULANE si tienes o has tenido coágulos sanguíneos; un problema hereditario que hace que tu sangre se coagule más de lo normal; antecedentes de

presión arterial alta que la medicina no pueda controlar; diabetes con daños en los riñones, ojos, nervios o vasos sanguíneos; ciertos tipos de migrañas graves con aura, entumecimiento, debilidad o cambios en la visión o cualquier migraña si tiene más de 35 años; un IMC de 30 kg/m² o más; enfermedad hepática o tumores hepáticos; sangrado vaginal inexplicable; si ha tenido cáncer de mama o cualquier cáncer sensible a las hormonas femeninas; si toma medicamentos contra la hepatitis C que contengan ombitasvir/paritaprevir/ritonavir, con o sin dasabuvir, ya que esto puede aumentar los niveles de la enzima hepática "alanina aminotransferasa" (ALT) en la sangre; o si está o puede estar embarazada.

Consulta la Información de seguridad importante completa en las páginas 20 y 21 y el [Breve resumen de información para el consumidor que se adjunta](#), incluida la **ADVERTENCIA**.

¿Cómo empiezo a usar XULANE?

Xulane®
(sistema transdérmico de
norelgestromina y etinilestradiol)
150/35 µg al día

Si actualmente no utilizas ningún anticonceptivo hormonal, tienes dos opciones para empezar a usar el parche. Elige la opción más adecuada para ti:

Empezar el primer día

Ponte el primer parche durante las primeras 24 horas de tu período menstrual.

Empezar el domingo

Ponte el primer parche el primer domingo después de comenzar tu período menstrual. Usa un método anticonceptivo no hormonal, como un condón con preservativo o un diafragma con espermicida, solo durante los primeros 7 días de tu primer ciclo. Si te viene el período el domingo, ponte el primer parche ese día, y no es necesario que utilices ningún método anticonceptivo complementario.

Si cambias la píldora o el anillo vaginal por el parche

Completa el ciclo de la píldora o el anillo vaginal actual. Colócate el primer parche el día en que normalmente empezarías a tomarte la siguiente píldora o a ponerte el siguiente anillo vaginal. Si no te viene el período en un plazo de una semana después de haber tomado la última pastilla activa o de haberte quitado el último anillo vaginal, visita a tu médico para asegurarte de que no estés embarazada. No obstante, puedes empezar a usar el parche anticonceptivo igualmente. Si empiezas a usar el parche más de una semana después de haber tomado la última píldora activa o de haber extraído el anillo vaginal, usa un método anticonceptivo no hormonal combinado con el parche durante los siete primeros días.

Si empiezas después del parto

Si no estás en período de lactancia, espera 4 semanas antes de usar el parche y usa un método anticonceptivo no hormonal, como un condón con preservativo o un diafragma con espermicida, solo durante los primeros 7 días de tu primer ciclo. Si has mantenido relaciones sexuales después de dar a luz a tu bebé, espera a tener tu primer período, o visita a tu profesional sanitario para asegurarte de que no estés embarazada antes de usar el parche.

Si se usa tras un aborto natural o provocado

Puedes empezar a usar el parche inmediatamente después de un aborto natural o provocado que tenga lugar en las primeras 12 semanas (primer trimestre) de embarazo. No es necesario que uses otro método anticonceptivo.

Si no empiezas a usar el parche en un plazo de 5 días después de un aborto natural o provocado, usa un método anticonceptivo no hormonal, como un preservativo con espermicida o un diafragma con espermicida mientras esperas a que empiece tu período. Debes seguir las instrucciones de la izquierda para empezar el primer día o empezar el domingo según lo que te convenga más, y leer toda la Información para el paciente para empezar a usar XULANE.

Si vas a empezar a usar el parche tras un aborto natural o provocado que haya tenido lugar después de las primeras 12 semanas de embarazo (segundo trimestre), espera 4 semanas antes de usar el parche y usa un método anticonceptivo no hormonal, como un preservativo con espermicida o un diafragma con espermicida, solo durante los primeros 7 días de tu primer ciclo. Si has mantenido relaciones sexuales después de abortar de forma natural o provocada, espera a tener tu primer período o visita a tu profesional sanitario para asegurarte de que no estés embarazada antes de usar el parche.¹

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (Continuación)

Antes de usar XULANE:

Comenta con tu profesional sanitario todas las enfermedades que padeces, incluyendo:

- Si estás embarazada o crees que puedes estarlo.
- Si tienes programada una intervención, ya que XULANE puede aumentar el riesgo de que se formen coágulos de sangre tras la intervención. Debes dejar de usar el parche XULANE al menos 4 semanas antes y hasta que hayan pasado al menos 2 semanas tras la intervención.
- Si tienes programado hacerte algún análisis, ya que XULANE puede afectar a ciertos análisis de sangre.

Consulta la Información de seguridad importante completa en las páginas 20 y 21 y el [Breve resumen de información para el consumidor que se adjunta](#), incluida la **ADVERTENCIA**.

- Si tu piel o tus ojos han presentado una coloración amarilla causada por el embarazo o relacionada con el uso previo de anticonceptivos hormonales.
- Estás en período de lactancia o planeas amamantar. XULANE puede reducir la cantidad de leche que produzcas, y es posible que una pequeña cantidad de las hormonas del parche XULANE se transfieran a la leche materna.

Comenta con tu profesional sanitario todos los medicamentos y productos de fitoterapia que estés tomando, incluidos aquellos para las convulsiones y el tratamiento reemplazativo de la hormona tiroidea, ya que algunos de estos pueden requerir un ajuste de dosis o hacer que XULANE sea menos eficaz. Usa otro método anticonceptivo (como un preservativo con espermicida o un diafragma con espermicida) cuando tomes medicamentos que puedan hacer que el parche XULANE sea menos eficaz.

Algunos medicamentos y el zumo de pomelo pueden aumentar tus niveles de hormona etinilestradiol si se combinan con XULANE.

Preparación para la aplicación de XULANE

Xulane®
(sistema transdérmico de norelgestromina y etinilestradiol)
150/35 µg al día

Usa XULANE siguiendo exactamente las indicaciones de tu profesional sanitario. Coloca el parche en la parte externa del brazo, en el abdomen, en la nalga o en la espalda, en un lugar donde no lo roce la ropa ajustada. Por ejemplo, no debes colocarlo debajo de la cintura de un pantalón o falda. **No** lo pongas en el pecho, sobre cortes o partes irritadas de la piel o en el mismo sitio que el último parche. **Do not damage, or alter the XULANE Patch in any way.**¹

Antes de colocarlo

Asegúrate de que tu piel esté limpia y seca. No uses lociones, cremas, aceites, polvos o maquillaje en la zona del parche. Esto puede impedir que el parche se pegue correctamente y hacer que se suelte.

Aplicación de XULANE



Abre el envoltorio por la parte superior y por un lateral. Retira el envoltorio de aluminio y extrae el contenido con cuidado. Desecha los protectores de plástico adicionales que hay por encima y por debajo del parche.



Retira la mitad del plástico transparente. Evita tocar la parte adhesiva con los dedos.



Coloca la parte adhesiva del parche sobre tu piel limpia y seca. Retira la otra mitad del plástico transparente y pega todo el parche a tu piel.

Comprueba el parche todos los días para asegurarte de que todos los extremos estén bien adheridos.

[Visit Xulane.com](https://www.xulane.com)



Presiona con firmeza sobre el parche con la palma de la mano durante 10 segundos. Asegúrate de que el parche entero quede adherido a tu piel. Pasa los dedos por toda la superficie del parche para eliminar cualquier posible "arruga" que haya quedado alrededor de los bordes exteriores. **El parche XULANE debe estar bien pegado a tu piel para que funcione adecuadamente.**

Cómo debo usar XULANE

Usa un parche XULANE cada vez. Asegúrate de retirar el parche antiguo antes de colocarte uno nuevo. **No** deje de usar ningún parche de XULANE, aunque no tenga relaciones

sexuales con frecuencia. XULANE se aplica en un ciclo de 4 semanas.

Consulta la página 16 para más información sobre cómo usar XULANE.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (Continuación)

¿Cuáles son los riesgos más graves de tomar XULANE?

XULANE puede causar efectos secundarios graves, incluida la formación de coágulos sanguíneos, especialmente si se tienen otros factores de riesgo como fumar, la obesidad o una edad superior a los 35 años. Algunos ejemplos de formación de coágulos sanguíneos son la trombosis venosa profunda (piernas), las embolias pulmonares (pulmones), la pérdida de visión (ojos), los ataques cardíacos (corazón) y los accidentes cerebrovasculares (cerebro).

Todos ellos pueden causar la muerte o discapacidad permanente.

El riesgo de que se formen coágulos de sangre es mayor cuando se empieza a utilizar XULANE y cuando se vuelve a utilizar XULANE o un anticonceptivo hormonal diferente después de una pausa de un mes o más. Algunos estudios indican que las mujeres

Consulta la Información de seguridad importante completa en las páginas 20 y 21 y el [Breve resumen de información para el consumidor que se adjunta](#), incluida la **ADVERTENCIA**.

que usan un sistema transdérmico con norelgestromina y etinilestradiol tienen un mayor riesgo de formar un coágulo. Habla con tu profesional sanitario sobre tu riesgo de formar un coágulo antes de usar XULANE o de decidir qué tipo de método anticonceptivo es adecuado para ti.

Cómo debo usar XULANE (continuación)

- Ponte un parche una vez a la semana durante 3 semanas (21 días en total).
- Ponte un parche nuevo el mismo día de la semana. Este día será tu “día de cambiar el parche”. Por ejemplo, si te pones el primer parche un lunes, todos los parches deberás ponértelos en lunes.
- No te pongas ningún parche durante la semana 4. Asegúrate de quitarte el parche antiguo. Esta es tu semana de descanso. Tu período menstrual debería empezar durante la semana de descanso.
- Inicia un nuevo ciclo de 4 semanas aplicando un nuevo parche al día siguiente de que finalice la semana 4. Repite el ciclo de 1 aplicación semanal durante 3 semanas, seguido de una semana de descanso.
- No debes estar nunca más de 7 días seguidos sin ponerte un parche. Si pasas más de 7 días seguidos sin ponerte un parche y mantienes relaciones sexuales durante este tiempo, puedes quedarte embarazada.
- Si no te viene el período, es posible que estés embarazada. Algunas mujeres no tienen el período o tienen períodos muy ligeros cuando usan métodos anticonceptivos hormonales, incluso aunque no estén embarazadas. Ponte en contacto con tu profesional sanitario si no te viene el período o no has usado el parche todos los días o si tienes dos faltas seguidas.

Si el parche XULANE te molesta o si la zona en la que te lo has colocado se enrojece, se hincha o te duele, retira el parche y ponte uno nuevo en otro sitio hasta tu siguiente “día de cambiar el parche”.

Para desechar el parche XULANE, dóblalo por la mitad de modo que quede pegado por la parte adhesiva, colócalo en un recipiente resistente a prueba de niños, y tira el recipiente a la basura. Los parches de XULANE usados no deben tirarse al váter.

Conservar a temperatura ambiente entre 20 y 25° C (entre 68 y 77° F).

No conservar en nevera o congelador.¹

Xulane®
(sistema transdérmico de
norelgestromina y etinilestradiol)
150/35 µg al día



Para obtener información sobre qué hacer si los extremos del parche XULANE se levantan o si el parche XULANE se despega parcial o completamente, lee la Información para el paciente que se incluye en el Breve resumen de información para el consumidor que se adjunta.

Paciente no real. El parche se muestra a escala.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (Continuación)

Llama a tu profesional sanitario inmediatamente si tienes:

Dolor en las piernas que no desaparece; dificultad para respirar repentina; ceguera repentina, parcial o completa; dolor intenso o presión en el pecho; cefalea repentina y grave, distinta de las cefaleas habituales; debilidad o entumecimiento en un brazo o pierna, o dificultad para hablar; coloración amarilla de la piel o los ojos.

Consulta la Información de seguridad importante completa en las páginas 20 y 21 y el [Breve resumen de información para el consumidor que se adjunta](#), incluida la **ADVERTENCIA**.

Otros riesgos graves incluyen:

Problemas hepáticos incluidos tumores en el hígado, problemas en la vesícula biliar; presión arterial alta.

¿Cuáles son los efectos secundarios más frecuentes de XULANE?

Los efectos secundarios más frecuentes comunicados en al menos un 5 % de las mujeres durante los ensayos clínicos fueron síntomas mamarios (molestias, hinchazón o dolor); náuseas/vómitos; cefalea; irritación, enrojecimiento, dolor o hinchazón de la piel, picor o erupción en el lugar de aplicación del parche; dolor de estómago; dolor durante la menstruación; sangrado vaginal y trastornos menstruales, como manchado o sangrado entre períodos; y trastornos anímicos, afectivos y de ansiedad.

Pasar de otro método anticonceptivo al parche XULANE

Xulane®
(sistema transdérmico de norelgestromina y etinilestradiol)
150/35 µg al día

Píldora anticonceptiva hormonal en combinación por vía oral

- Si pasas de la píldora a XULANE, debes completar tu ciclo actual de la píldora y colocarte el primer parche de XULANE el día que normalmente comenzarías tu siguiente píldora.
- Si no te viene el período en un plazo de una semana después de haber tomado la última píldora activa, debes visitar a tu profesional sanitario para asegurarte de que no estés embarazada, aunque puedes continuar y empezar a usar XULANE como anticonceptivo.
- Si te aplicas el parche más de una semana después de tomar la última píldora activa, debes utilizar un anticonceptivo no hormonal de refuerzo (como preservativos y espermicida, o diafragma y espermicida) además de XULANE durante los primeros 7 días de uso del parche.

Parche anticonceptivo

- Si pasas de otro parche anticonceptivo a XULANE, debes completar tu ciclo actual del parche y colocarte el parche de XULANE el día que normalmente comenzaría el siguiente ciclo del parche.
- Si no te viene el período en un plazo de una semana después de haberte quitado el último parche, debes visitar a tu profesional sanitario para asegurarte de que no estés embarazada, aunque puedes continuar y empezar a usar XULANE como anticonceptivo.
- Si te aplicas el parche más de una semana después de haberte quitado el último parche, debes utilizar un anticonceptivo no hormonal de refuerzo (como preservativos y espermicida, o diafragma y espermicida) además de XULANE durante los primeros 7 días de uso del parche.

Anillo vaginal

- Si pasas del anillo vaginal a XULANE, debes completar tu ciclo actual del anillo vaginal y colocarte el primer parche de XULANE el día que normalmente te insertarías tu siguiente anillo vaginal.
- Si no te viene el período en un plazo de una semana después de haberte quitado el último anillo vaginal, debes visitar a tu profesional sanitario para asegurarte de que no estés embarazada, aunque puedes continuar y empezar a usar XULANE como anticonceptivo.
- Si te aplicas el parche más de una semana después de haberte quitado el último anillo vaginal, debes utilizar un anticonceptivo no hormonal de refuerzo (como preservativos y espermicida, o diafragma y espermicida) además de XULANE durante los primeros 7 días de uso del parche.

Dispositivo intrauterino (DIU)

- Si pasas de un dispositivo intrauterino a XULANE, debes colocarte el primer parche de XULANE el día que te retiren el DIU.
- Si no te han retirado el DIU el primer día de tu ciclo menstrual, debes utilizar un anticonceptivo no hormonal de refuerzo (como preservativos y espermicida, o diafragma y espermicida) además de XULANE durante los primeros 7 días de uso del parche.

Inyección

- Si pasas de un anticonceptivo inyectable a XULANE, debes colocarte el primer parche de XULANE el día que normalmente te tocaría la siguiente inyección.

Implante

- Si pasas de un implante a XULANE, debes colocarte el primer parche de XULANE el día que te retiren el implante.

Píldora de progestágeno solo

- Si pasas de una píldora de progestágeno solo a XULANE, debes colocarte el primer parche de XULANE el día que normalmente comenzaría el siguiente ciclo de la píldora de progestágeno solo.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (Continuación)

Comenta con tu profesional sanitario cualquier efecto secundario que te preocupe o que no desaparezca. Estos no son todos los posibles efectos secundarios de XULANE. Si deseas obtener más información, consulta a tu profesional sanitario o farmacéutico. **Llama a tu profesional sanitario para recibir asesoramiento médico sobre los efectos secundarios.**

Te animamos a que informes a la FDA sobre los efectos secundarios negativos de medicamentos de venta con receta.

Visita www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.

Consulta la Información de seguridad importante completa en las páginas 20 y 21 y el [Breve resumen de información para el consumidor que se adjunta](#), incluida la, **ADVERTENCIA**.

¿Los anticonceptivos hormonales provocan cáncer?

No se sabe si los anticonceptivos hormonales provocan cáncer. Algunos estudios, pero no todos, parecen indicar que podría haber un ligero aumento del riesgo de cáncer de mama entre las usuarias actuales que los hayan utilizado durante más tiempo.

Las mujeres que utilicen métodos anticonceptivos hormonales pueden tener una probabilidad ligeramente más alta de padecer cáncer de cuello uterino. Sin embargo, este puede deberse a otros motivos como tener más parejas sexuales.

Esta no es toda la información que debes leer antes de usar XULANE.

Consulta el Breve resumen de información para el consumidor que se adjunta, incluida la **ADVERTENCIA**.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

¿Qué es XULANE?

XULANE es un parche anticonceptivo para mujeres con un IMC inferior a 30 kg/m².

Contiene dos hormonas femeninas, un estrógeno denominado etinilestradiol y un progestágeno denominado norelgestromina.

Las hormonas de XULANE penetran en el torrente sanguíneo y el organismo las procesa de un modo diferente a las hormonas de las píldoras anticonceptivas. **Si usas XULANE, estarás expuesta a alrededor de un 60 % más de estrógeno que si usas una píldora anticonceptiva común con 35 microgramos de estrógeno.** En general, un mayor porcentaje de estrógeno puede aumentar el riesgo de sufrir efectos secundarios.

Limitaciones de uso:

XULANE puede no ser tan eficaz en mujeres que pesan más de 198 libras.

Si pesas más de 90 kg (198 lbs), habla con tu profesional sanitario para determinar cuál es el método anticonceptivo más adecuado para ti.

No uses XULANE si tu índice de masa corporal (IMC) es de 30 kg/m² o más.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

ADVERTENCIA

¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre XULANE?

No uses XULANE si eres fumadora y tienes más de 35 años. El tabaco aumenta el riesgo de padecer efectos secundarios cardiovasculares graves con el uso de métodos anticonceptivos hormonales, incluida la muerte por ataque al corazón, coágulos sanguíneos o derrame cerebral. Este riesgo aumenta con la edad y con el número de cigarrillos que fumes. No uses XULANE si tienes un riesgo alto de formación de coágulos. No uses XULANE si tu índice de masa corporal (IMC) es de 30 kg/m² o más. Las mujeres con un IMC de 30 kg/m² o más que usen XULANE pueden tener un mayor riesgo de formar coágulos sanguíneos en comparación con las mujeres con un IMC inferior a 30 kg/m².

XULANE no protege contra la infección por VIH (SIDA) ni contra otras infecciones de transmisión sexual.

¿Quién no debería usar XULANE?

No uses XULANE si tienes o has tenido coágulos sanguíneos; un problema hereditario que hace que tu sangre se coagule más de lo normal; antecedentes de ataque cardíaco, accidente cerebrovascular o ciertos problemas de valvulopatías o del ritmo cardíaco que puedan provocar que se formen coágulos de sangre en el corazón; presión arterial alta que no se puede controlar con medicamentos; diabetes con daño renal, ocular, nervioso o en vasos sanguíneos; determinados tipos de cefaleas migrañosas graves con aura, entumecimiento, debilidad o alteraciones de la visión, o algún tipo de cefalea migrañosa si tienes más de 35 años; un IMC de 30 o más; enfermedad hepática o tumores en el hígado; sangrados vaginales sin explicación; has tenido cáncer de mama o algún tipo de cáncer sensible a las hormonas femeninas; si tomas medicamentos para la hepatitis C que contengan ombitasvir/paritaprevir/ritonavir, con o sin dasabuvir, ya que esto puede aumentar los niveles de la enzima hepática "alanina aminotransferasa" (ALT) en la sangre; o si estás o pudieras estar embarazada.

Antes de usar XULANE:

Comenta con tu profesional sanitario todas las enfermedades que padeces, incluyendo:

- Si estás embarazada o crees que puedes estarlo.
- Si tienes programada una intervención, ya que XULANE puede aumentar el riesgo de que se formen coágulos de sangre tras la intervención. Debes dejar de usar el parche XULANE al menos 4 semanas antes y hasta que hayan pasado al menos 2 semanas tras la intervención.
- Si tienes programado hacerte algún análisis, ya que XULANE puede afectar a ciertos análisis de sangre.
- Si tu piel o tus ojos han presentado una coloración amarilla causada por el embarazo o relacionada con el uso previo de anticonceptivos hormonales.
- Estás en período de lactancia o planeas amamantar. XULANE puede reducir la cantidad de leche que produzcas, y es posible que una pequeña cantidad de las hormonas del parche XULANE se transfieran a la leche materna.

Comenta con tu profesional sanitario todos los medicamentos y productos de fitoterapia que estés tomando, incluidos aquellos para las convulsiones y el tratamiento reemplazativo de la hormona tiroidea, ya que algunos de estos pueden requerir un ajuste de dosis o hacer que XULANE sea menos eficaz. Usa otro método anticonceptivo (como un preservativo con espermicida o un diafragma con espermicida) cuando tomes medicamentos que puedan hacer que el parche XULANE sea menos eficaz. Algunos medicamentos y el zumo de pomelo pueden aumentar tus niveles de hormona etinilestradiol si se combinan con XULANE.

¿Cuáles son los riesgos más graves de tomar XULANE?

XULANE puede causar efectos secundarios graves, incluida la formación de coágulos sanguíneos, especialmente si se tienen otros factores de riesgo como fumar, la obesidad o una edad superior a los 35 años. Algunos ejemplos de formación de coágulos sanguíneos son la trombosis venosa profunda (piernas), las embolias pulmonares (pulmones), la pérdida de visión (ojos), los ataques cardíacos (corazón) y los accidentes cerebrovasculares (cerebro). **Todos ellos pueden causar la muerte o discapacidad permanente.**

El riesgo de formación de coágulos sanguíneos es más alto cuando se usa XULANE por primera vez y al volver a usar XULANE u otro anticonceptivo hormonal distinto, después de una pausa de un mes o más. Algunos estudios indican que las mujeres que usan un sistema transdérmico con norelgestromina y etinilestradiol tienen un mayor riesgo de formar un coágulo. Habla con tu profesional sanitario sobre tu riesgo de formar un coágulo antes de usar XULANE o de decidir qué tipo de método anticonceptivo es adecuado para ti.

Llama a tu profesional sanitario inmediatamente si tienes:

Dolor en las piernas que no desaparece; dificultad para respirar repentina; ceguera repentina, parcial o completa; dolor intenso o presión en el pecho; cefalea repentina y grave, distinta de las cefaleas habituales; debilidad o entumecimiento en un brazo o pierna, o dificultad para hablar; coloración amarilla de la piel o los ojos.

Otros riesgos graves incluyen:

Problemas hepáticos incluidos tumores en el hígado, problemas en la vesícula biliar; presión arterial alta.

¿Cuáles son los efectos secundarios más frecuentes de XULANE?

Los efectos secundarios más frecuentes comunicados en al menos un 5 % de las mujeres durante los ensayos clínicos fueron síntomas mamarios (molestias, hinchazón o dolor); náuseas/vómitos; cefalea; irritación, enrojecimiento, dolor o hinchazón de la piel, picor o erupción en el lugar de aplicación del parche; dolor de estómago; dolor durante la menstruación; sangrado vaginal y trastornos menstruales, como manchado o sangrado entre períodos; y trastornos anímicos, afectivos y de ansiedad.

Comenta con tu profesional sanitario cualquier efecto secundario que te preocupe o que no desaparezca. Estos no son todos los posibles efectos secundarios de XULANE. Si deseas obtener más información, consulta a tu profesional sanitario o farmacéutico. **Llama a tu profesional sanitario para recibir asesoramiento médico sobre los efectos secundarios. Te animamos a que informes a la FDA sobre los efectos secundarios negativos de medicamentos de venta con receta. Visita www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.**

¿Los anticonceptivos hormonales provocan cáncer?

No se sabe si los anticonceptivos hormonales provocan cáncer. Algunos estudios, pero no todos, parecen indicar que podría haber un ligero aumento del riesgo de cáncer de mama entre las usuarias actuales que los hayan utilizado durante más tiempo. Las mujeres que utilicen métodos anticonceptivos hormonales pueden tener una probabilidad ligeramente más alta de padecer cáncer de cuello uterino. Sin embargo, este puede deberse a otros motivos como tener más parejas sexuales.

Esta no es toda la información que debes leer antes de usar XULANE. Consulta el Breve resumen de información para el consumidor que se adjunta, incluida la **ADVERTENCIA**.

Nuestro programa de Tarjeta de ahorro XULANE

Xulane®
(sistema transdérmico de norelgestromina y etinilestradiol)
150/35 µg al día

Save up to \$100 for the first prescription fill of Xulane®* and up to \$25 after you pay the first \$15 for each subsequent prescription fill

*Eligibility restrictions apply. See full Terms and Conditions below. Not valid for patients enrolled in federal or state healthcare programs, such as Medicare, Medicaid, and TRICARE, and not valid for uninsured patients (but may be used by commercially insured patients without coverage for Xulane®). Mylan Pharmaceuticals Inc., a Viatris Company, reserves the right to amend or end this program at any time without notice.

RxBIN: 610524
RXPEN: Loyalty
RXGRP: 5077450
ISSUER: 80840

ID: <XXXXXXXXXX>



Esta tarjeta de ahorro no está disponible para pacientes sin seguro o pacientes que estén cubiertas por un programa de cuidado de la salud financiado por el estado o el gobierno federal.

Consulte los términos y condiciones completos.



¿Qué es la Tarjeta de ahorro XULANE?

Es una oferta de ahorro que puede reducir sus gastos de bolsillo en recetas de XULANE a un **mínimo de \$0** en la dispensación de su primera receta y \$15 en la dispensación de cada receta posterior.



Las pacientes elegibles que tienen un seguro de salud comercial pueden **recibir hasta \$100** de descuento en la dispensación de la primera receta para 28 días de XULANE. Para las dispensaciones posteriores, las pacientes elegibles que tienen un seguro de salud comercial y **pagan \$15 en la dispensación de cada receta posterior, pueden recibir hasta \$25** de descuento en la dispensación de cada receta para 28 días de XULANE, hasta un máximo acumulado de **\$425 por año natural**.



Y puede imprimir la oferta de ahorro desde su ordenador o guardarla en su smartphone y presentársela a su farmacéutico. Simplemente presente su tarjeta en la farmacia cada vez que entregue o renueve su receta.

XULANE® (SISTEMA TRANSDÉRMICO DE NORELGESTROMINA Y ETINILESTRADIOL) 150/35 µg AL DÍA SEGÚN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA TARJETA DE AHORRO

Esta Tarjeta de ahorro puede utilizarse para reducir la cantidad de sus gastos de bolsillo en XULANE® (sistema transdérmico de norelgestromina y etinilestradiol) 150/35 µg al día hasta un máximo de \$100 por receta para 28 días para la primera dispensación, y luego para dispensaciones posteriores, hasta un máximo de \$25 por receta para 28 días después de que usted pague los primeros \$15 por receta para 28 días, mientras este programa continúe en vigor. No es necesario realizar otra compra. Esta oferta puede utilizarse hasta un total de 14 veces por año natural, hasta un máximo acumulado de \$425 por año natural, mientras este programa continúe en vigor. Se requiere receta válida con n.º de ID del prescriptor. Mylan Pharmaceuticals Inc., una empresa de Viatris, se reserva el derecho a modificar o finalizar este programa en cualquier momento sin previo aviso.

Requisitos de idoneidad: esta Tarjeta de ahorro solo puede ser canjeada por pacientes o tutores de pacientes que tengan 18 años de edad o más y que sean residentes de los Estados Unidos y sus territorios. Las pacientes deben tener un seguro comercial. Este programa no es válido para pacientes sin seguro (pero puede ser utilizado por pacientes aseguradas comercialmente sin cobertura de XULANE) y pacientes que estén cubiertas por cualquier programa de cuidado de la salud financiado por el estado o el gobierno federal, incluidos

Consulta la Información de seguridad importante completa en las páginas 20 y 21 y el

[Breve resumen de información para el consumidor que se adjunta](#), incluida la **ADVERTENCIA**.

entre otros, cualquier programa estatal de asistencia farmacéutica, Medicare (parte D o de otro tipo), Medicaid, Medigap, VA o DOD, o TRICARE (independientemente de si XULANE está cubierto por dicho programa gubernamental); no es válido si el paciente es elegible para Medicare y está inscrito en un plan de salud patrocinado por el empleador o en un programa de beneficio de recetas para jubilados; y no es válido si el plan de seguro del paciente paga el coste total de esta receta. Este programa no es válido fuera de los EE. UU. y sus territorios o donde lo prohíba la ley, esté sujeto a impuestos o esté restringido. En ausencia de un cambio en la ley de Massachusetts, este programa ya no será válido para los residentes de Massachusetts a partir del 1 de enero de 2023. Este programa no es válido para los residentes de California.

Esta Tarjeta de ahorro no es un seguro de salud. Esta Tarjeta de ahorro no es transferible, y la cuantía del ahorro no puede exceder los gastos de bolsillo del paciente. Este programa no puede combinarse con ningún otro descuento/cupón, prueba gratuita u oferta similar para la receta especificada. Esta tarjeta de ahorro no es canjeable por dinero en efectivo.

AVISO: Los datos relacionados con el uso de esta Tarjeta de ahorro pueden recopilarse, analizarse y compartirse con Mylan Pharmaceuticals Inc. para investigación de mercado y otros fines relacionados con la evaluación de programas de cupones. Los datos compartidos con Mylan Pharmaceuticals Inc. se agregarán y se anonimizarán, lo que significa que se combinarán con datos relacionados con otros canjes de tarjetas de ahorro y no le identificarán.

Instrucciones para la paciente: Bal usar esta Tarjeta de ahorro, usted reconoce que actualmente cumple con los criterios de idoneidad y que comprende y cumplirá con los siguientes términos y condiciones adicionales:

- No ha presentado y no presentará una reclamación de reembolso bajo ningún programa federal, estatal u otro programa gubernamental para esta receta.
- Su uso de esta Tarjeta de ahorro debe ser coherente con los términos de cualquier beneficio de medicamentos proporcionado por su aseguradora de salud comercial, plan de salud o pagador externo privado. Usted acepta informar el uso de esta Tarjeta de ahorro a su aseguradora comercial si es necesario.
- Cuando sea necesario, deberá presentar a su farmacéutico una Tarjeta de ahorro y una tarjeta de seguro de medicamentos de venta con receta, junto con una receta válida de XULANE.

Instrucciones para el farmacéutico: cuando acepta esta Tarjeta de ahorro, certifica que ha recibido esta Tarjeta de ahorro de una paciente apta; ha recibido una receta válida de XULANE para una paciente apta; ha dispensado el producto como se indica; no ha presentado y no presentará una reclamación de reembolso bajo ningún programa federal, estatal u otro programa gubernamental para esta receta; y de lo contrario cumplirá con estos términos y con todos los términos y condiciones aplicables. Asimismo, certifica que su participación en este programa está en conformidad con todas las leyes estatales aplicables y cualquier obligación, contractual o de otro tipo, que tenga como proveedor de farmacia, y que informará el uso de esta Tarjeta de ahorro a la aseguradora de la paciente si es necesario.

- Envíe la transacción a McKesson Corporation usando BIN #610524.
- Para pacientes aseguradas comercialmente, introduzca la información de esta Tarjeta de ahorro como cobertura secundaria y transmitala usando el segmento COB de la transacción NCPDP. Los ahorros correspondientes a la paciente se mostrarán en la respuesta de la transacción.
- La aceptación de esta Tarjeta de ahorro y el envío de sus reclamaciones para el programa de la Tarjeta de ahorro XULANE® están sujetos a los términos y condiciones de la Tarjeta de ahorro publicados en www.activatecard.com/viatrisadvocate/xulane/welcome#nc.
- La aceptación de esta Tarjeta de ahorro y el envío de sus reclamaciones para el programa de la Tarjeta de ahorro XULANE® están sujetos a los términos y condiciones del programa LoyaltyScript® publicados en www.mckesson.com/mprstnc.
- Para cualquier pregunta sobre la configuración, la transmisión de reclamaciones, la idoneidad de la paciente u otros asuntos, llame al LoyaltyScript® para el programa de la Tarjeta de ahorro XULANE® al número 800-657-7613 (de 8:00 h a 16:00 h EST, de lunes a viernes).

Xulane®

(sistema transdérmico de norelgestromina y etinilestradiol)
150/35 µg al día

Pide a tu médico que indique “dispensar la marca recetada”

(Dispense As Written, DAW)* o el idioma que se usa en tu estado (si procede) en todas tus recetas de XULANE, de manera que sepas que estás recibiendo el mismo parche XULANE que te han recetado—parche a parche, mes a mes.

Algunas farmacias pueden dispensar la receta de XULANE con un genérico diferente y pueden no tener que notificártelo.

Comprueba tu bolsa antes de salir de la farmacia para asegurarte de que te han dado XULANE. Si crees que te han cambiado la receta, habla con el farmacéutico. Puedes obtener el parche XULANE como te lo haya recetado el médico.



Puedes obtener 3 meses de XULANE a la vez con un año de resumistros. Pide a tu médico que te recete 9 parches con 3 resumistros.†

A nivel nacional, casi el **91%** de todas las recetas dispensadas de XULANE para pacientes con seguro comercial tuvieron un gasto de bolsillo de **\$0** después del seguro durante los 12 meses que finalizaron el 30/11/21‡

* El idioma y los requisitos pueden variar según la ley estatal.

† Los formularios varían y están sujetos a cambios sin previo aviso; compruebe directamente el plan para determinar la información más actual. Esto no es una garantía de cobertura ni de pago (total o parcial); el estado de residencia puede afectar la cobertura y la dispensación.

‡ Es responsabilidad exclusiva del profesional sanitario tratar de confirmar la cobertura, la codificación y la guía de presentación de reclamaciones con el plan de seguro médico de la paciente para garantizar que las reclamaciones de XULANE son precisas, están completas y respaldadas por documentación en la historia clínica de la paciente. Los códigos ICD-10 permitidos pueden variar según el pagador. VIATRIS™ no garantiza que los pagadores considerarán todos los códigos apropiados para todos los escenarios de encuentro y Viatrix no garantiza la cobertura ni el reembolso de XULANE.

Consulta la Información de seguridad importante completa en las páginas 20 y 21 y el [Breve resumen de información para el consumidor que se adjunta](#), incluida la **ADVERTENCIA**.

Bibliografía: 1. XULANE Prescribing Information 03/22, Morgantown, WV; Mylan Pharmaceuticals Inc. 2. IQVIA Stakeholder Analytics, MAT November 2021.

VIATRIS and the Viatrix Logo are trademarks of Mylan Inc., a Viatrix Company.

XULANE is a registered trademark of Mylan Pharmaceuticals Inc., a Viatrix Company.

VIATRIS ADVOCATE and the Viatrix Advocate Logo are registered trademarks of Mylan Inc., a Viatrix Company.

LOYALTYSCRIPT is a registered trademark of McKesson Corporation.

© 2022 Viatrix Inc. All Rights Reserved. XUL-2022-0022

